

Règlement maladies

Ce document permet aux collaborateurs ainsi qu'aux parents d'avoir un cadre d'orientation concernant la prise en charge des enfants malades. Les enfants peuvent être accueillis dans les crèches kids & co tant qu'ils se sentent bien et qu'ils peuvent participer à la vie quotidienne de la crèche. Un enfant malade se sent mieux à la maison dans son environnement familial, la crèche ne pouvant pas offrir le calme dont un enfant a besoin.

Principes

- Les parents sont tenus d'informer l'équipe éducative des maladies contractées par leurs enfants
- En cas de prise d'antibiotiques, le retour de l'enfant est accepté sur décision du pédiatre de l'enfant ou du pédiatre référent de la crèche.
- Selon les directives de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les personnes qui n'ont pas été vaccinées contre la rougeole doivent être exclues pendant 3 semaines au maximum, en cas de suspicion de maladie. Les cotisations seront facturées pendant cette période. En cas d'épidémie les directives cantonales et fédérales s'appliquent. De plus la direction de crèche est habilitée à établir d'autres directives si nécessaires et est responsable de communiquer la marche à suivre par écrit.
- Le médecin référent de la crèche ou la direction de crèche doit signaler au Médecin cantonal, les maladies listées dans le document « Recommandations romandes et tessinoises d'éviction préscolaire pour maladies transmissibles » et listé dans le site « [évictionscolaire.ch](http://evictionscolaire.ch) » et nécessitant une éviction ou des mesures d'accompagnement.

Adresse de contact pour information supplémentaire :
OFFICE DU MÉDECIN CANTONAL
Avenue des Casernes 2
1014 Lausanne
Tél. 021 316 47 95

Maladie	Symptômes	Prise en charge à la crèche ?	Remarques
Pied-main-bouche	<ul style="list-style-type: none"> • A un mal de gorge, de la fièvre, des maux de tête ou une perte d'appétit ; • A parfois de la toux, le nez qui coule, une diarrhée ou des vomissements • A des boutons rouges dans la bouche sur lesquels se trouvent de petites bulles. Ils sont douloureux et occasionnent un mal de gorge • A aussi de petites vésicules sur la paume des mains, la plante des pieds et sur les fesses. Habituellement, les vésicules apparaissent en même temps sur toutes les régions du corps. 	<p>Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...: ...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence</p> <p>Décision Si l'enfant se porte bien et présente un bon état général l'enfant peut fréquenter la crèche</p> <p>Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie : Moyenne : 3-5 jours</p>	
Gastro-entérite virale	<ul style="list-style-type: none"> • Des vomissements, • De la diarrhée, • Des crampes ou des douleurs au ventre, • Parfois de la fièvre 	<p>Éviction</p> <p>Situations justifiant l'application de la mesure : Éviction d'un enfant: nécessaire si la capacité de l'établissement à maintenir les mesures d'hygiène est dépassée.</p> <p>Levée de la mesure : Dès 48 heures suivant l'arrêt de la diarrhée aiguë</p> <p>Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie : Moyenne : 36 heures Maximum: 72 heures</p>	<p>Mesure N°1: Contrôle de l'application stricte des mesures standard d'hygiène, en particulier lavage des mains</p> <p>Mesure N°2: Port de gants jetables par le personnel lors du change d'un enfant symptomatique</p> <p>Mesure N°3: Renforcement des mesures de nettoyage et désinfection des locaux, objets et jouets</p>
Influenza (virus) : Grippe saisonnière, Bronchite grippale,	<ul style="list-style-type: none"> • Les symptômes typiques d'une grippe sont les suivants : apparition soudaine 	Éviction	

<p>Laryngite grippale Pneumonie grippale, Sinusite aiguë grippale, Trachéite grippale</p>	<p>d'une forte fièvre (> 38°C), frissons, toux, maux de gorge, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, rhume, vertige et perte d'appétit. Les enfants peuvent également avoir des nausées, des vomissements et des diarrhées, Une grippe peut durer jusqu'à deux semaines.</p>	<p>Levée de la mesure : Dès la fin de la symptomatologie</p>	
<p>Covid19 -> Virus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Symptômes d'affection aiguë des voies respiratoires (maux de gorge, toux (surtout sèche), insuffisance respiratoire, douleurs dans la poitrine) • Fièvre • Perte soudaine de l'odorat et/ou du goût • Les symptômes suivants peuvent aussi apparaître : • Maux de tête • Faiblesse générale, sensation de malaise • Douleurs musculaires • Rhume • Symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre) • Éruptions cutanées 	<p>Contactez immédiatement le service du médecin cantonal du domicile du patient</p> <p>Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie : Minimum : 2 jours Moyenne : 5 jours Maximum : >10 jours</p>	
<p>Poux</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortes démangeaisons sur le cuir chevelu 	<p>En cas de poux, un traitement doit être immédiatement mis en place.</p> <p>Décision</p>	<p>Les enfants qui ont les cheveux longs sont particulièrement touchés.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Les lentes se trouvent souvent dans la nuque, derrière les oreilles et sur les tempes. • Les poux sont difficilement reconnaissables = ils s'adaptent à la couleur des cheveux • Les lentes ressemblent à des pellicules de cheveux 	Après le premier traitement (effectué par les parents), l'enfant peut à nouveau fréquenter la crèche.	
Bronchiolite (Respiratoire syncytial virus)	<ul style="list-style-type: none"> • Une toux sèche s'installe et devient de plus en plus grasse, ce qui provoque un encombrement et une gêne respiratoire importants. La toux peut se prolonger pendant 2 à 3 semaines. • L'enfant présente une respiration sifflante • Une fièvre modérée • Fatigue, voire un épuisement 	<p>Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...:</p> <p>...mais le respect des précautions standard d'hygiène s'impose plus que jamais !</p> <p>Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie : Moyenne : 4-6 jours Maximum: 8 jours</p>	
Faux croup	<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre modérée • Voix rauque • Toux aboyant (nuit ++) • Détresse respiratoire 	<p>Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...:</p> <p>...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence</p> <p>Décision Si l'enfant se porte bien et présente un bon état général l'enfant peut fréquenter la crèche</p> <p>Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie : Moyenne : 48 heures Maximum : 6 jours</p>	

Rhume	<ul style="list-style-type: none"> • Légers maux de gorge • Toux et rhume • Douleurs articulaires ou musculaires • Fatigue 	<p>Décision Si l'enfant se porte bien et présent un bon état général l'enfant peut fréquenter la crèche</p>	
Scarlatine	<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre pouvant atteindre les 40 °C • La langue est recouverte d'une couche épaisse blanche (langue saburrable), puis présente une dépapillation et prend une couleur rouge framboisée en quelques jours. • Un à trois jours après le début de l'angine, une éruption cutanée, couleur rouge vif, apparaît. Elle débute généralement sous les aisselles, aux plis du coude et de l'aîne (les "plis de flexion") et peut ensuite toucher d'autres parties du corps : le haut du thorax, le bas de l'abdomen (rougeur dite "en caleçon"), le visage (sauf le pourtour de la bouche), les extrémités (à l'exception des paumes des mains et les plantes des pieds). 	<p>Décision Si l'enfant se porte bien et présent un bon état général l'enfant peut fréquenter la crèche</p> <p>Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie La période d'incubation est de 2 à 7 jours</p>	
Varicelle	<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre • Infection avec des signes cutanés et en particulier les fameux boutons de varicelle. Ces boutons se transforment ensuite en cloques 	<p>Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation... : ...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.</p> <p>Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie :</p>	<p>Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...: ...mais le respect des précautions standard d'hygiène s'impose plus que jamais !</p>

	remplies de liquide et sèchent pour former des croûtes	Minimum : 10 jours Moyenne : 14-16 jours Maximum: 21 jours	
Conjonctivite	<ul style="list-style-type: none"> • Virale ou bactérienne • Sécrétions lacrymales • Les yeux sont rouges et larmoyants • La sensation d'avoir "du sable dans l'œil" • Des sensations de brûlures • Des démangeaisons • 	<p>Décision En cas de suspicion de conjonctivite l'enfant doit consulter son pédiatre et peut fréquenter la crèche après la consultation et avis du pédiatre.</p>	<p>Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...: ...mais le respect strict des mesures standard d'hygiène, en particulier lavage des mains s'impose plus que jamais</p> <p>Renforcement des mesures de nettoyage et désinfection des locaux, objets et jouets</p>
Conjonctivite épidémique	<ul style="list-style-type: none"> • Les yeux sont rouges et larmoyants • La sensation d'avoir "du sable dans l'œil" • Des sensations de brûlures • Des démangeaisons 	<p>Éviction</p> <p>Levée de la mesure : Atteinte unilatérale: dès le 15ème jour suivant le début de la maladie Atteinte bilatérale: dès le 15ème jour suivant le début de la maladie dans le deuxième œil atteint</p> <p>Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie : Minimum : 3 jours Moyenne : 11 jours Maximum : 29 jours</p>	<p>Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...: ...mais le respect strict des mesures standard d'hygiène, en particulier lavage des mains s'impose plus que jamais</p> <p>Renforcement des mesures de nettoyage et désinfection des locaux, objets et jouets</p>
Impetigo (staphylocoque doré ou le streptocoque)	<ul style="list-style-type: none"> • Infection cutanée apparition de rougeurs qui démangent, apparition des cloques remplies de liquide ou de pus. • en général, le visage, les bras et les jambes sont touchés. • Une légère fièvre peut également être observée. 	<p>Éviction</p> <p>La période d'incubation est de 2 à 10 jours.</p> <p>Décision Les enfants ne peuvent pas fréquenter la crèche jusqu'à ce que le traitement antibiotique soit terminé.</p>	<p>Lorsque les vésicules éclatent ou sont grattées, elles libèrent d'autres agents pathogènes qui se transmettent à d'autres parties de la peau et à d'autres personnes. Lorsque les vésicules sèchent, elles forment des croûtes de couleur miel.</p>

Candidose buccale (Muguet)	<ul style="list-style-type: none"> • Un dépôt blanc dans la bouche et la gorge qui ressemble à du lait caillé. • Muqueuse buccale rouge, enflammée et parfois légèrement hémorragique • Une sensation de pâteuse dans la bouche, qui persiste même après les soins buccaux • Une altération du sens du goût 	<p>L'agent pathogène responsable du candidose buccale est contagieux. Le contact avec d'autres personnes ne doit pas pour autant être évité. En effet, l'infection ne se produit généralement que si la peau ou les muqueuses sont endommagées ou si le système immunitaire est affaibli. En d'autres termes, la candidose buccale ne survient pas à la suite d'une infection préalable, mais lorsque les agents pathogènes Candida albicans déjà présents sur la muqueuse buccale se multiplient librement.</p> <p><u>Décision</u> Si l'enfant se sent bien, il peut fréquenter la crèche.</p>	La mycose buccale est traitée avec une pommade prescrite par le médecin.
Gale ou scabiose	<ul style="list-style-type: none"> • la peau est infestée de minuscules parasites • Les acariens creusent dans la couche supérieure de la peau et y pondent des œufs. • La peau démange et une éruption cutanée se forme 	<p>ÉVICTION Les enfants peuvent être admis à la crèche 24h après le début du traitement / ou en cas d'exclusion certaine du diagnostic.</p>	<p>Les personnes vivant sous le même toit doivent être traitées -> https://www.gsi.be.ch/fr/start/themen/gesundheit/krankheiten-und-impfungen/uebertragbare-krankheiten-und-impfungen/kraetze.html</p>
Coqueluche, Pertussis	<ul style="list-style-type: none"> • Des symptômes d'allure grippale et une toux non caractéristique. Au bout de 1 à 2 semaines, les quintes de toux typiques avec reprise inspiratoire (chant du coq) apparaissent, lesquelles persistent pendant 1 à 6 semaines. Lors des accès de toux, le malade a des expectorations épaisses qui sont 	<p>Éviction</p> <p>Levée de la mesure :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maladie traité par antibiotique : dès le 5ème jour de traitement ou Malade non traité par antibiotique : dès le 22ème jour suivant le début de la toux 	<p>Les complications redoutées, surtout chez le nourrisson et l'enfant en bas âge, sont des pneumonies, des convulsions et une atteinte du cerveau.</p> <p>Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux): Cas isolé si exposition de nourrisson < 6 mois. Non, sauf si exposition de nourrisson < 6 mois.</p>

	souvent suivies de vomissements.		
--	----------------------------------	--	--

Rougeole	<ul style="list-style-type: none"> • Se manifeste par de la fièvre, de la fatigue, des douleurs abdominales, une sensibilité excessive à la lumière • Rhume et de maux de gorge • Fièvre • Éruption cutanée marquée 	<p>Éviction et confinement à domicile</p> <p>Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie : Avant le début de la première manifestation : Moyenne : 8-10 jours</p> <p>Levée de la mesure : Dès exclusion formelle de la rougeole par un test microbiologique ou Dès le 5ème jour suivant le début de l'exanthème (éruption)</p>	<p>Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux): Dans un délai de 24 heures</p>
Oreillons	<ul style="list-style-type: none"> • Maux de tête • Gonflement douloureux des glandes parotides 	<p>Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation... : ...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.</p> <p>Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie : Moyenne : 16-18 jours Maximum : 28 jours</p>	
Rubéole	<ul style="list-style-type: none"> • La maladie évolue de façon bénigne et s'accompagne dans environ la moitié des cas d'une éruption cutanée discrète sous forme de petites taches. Un gonflement des ganglions lymphatiques, surtout au cou et à la nuque, est typique. Des douleurs articulaires sont fréquentes 	<p>Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation... : ...mais le respect des précautions standard d'hygiène s'impose plus que jamais !</p> <p>Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie : Moyenne : 14-18 jours Maximum : 23 jours</p>	<p>La rubéole représente un danger particulier durant la grossesse. En cas d'infection d'une mère durant les six premières semaines de la grossesse, plus de la moitié des fœtus sont infectés par les virus de la rubéole. Plus la grossesse avance, plus le risque de transmission de la mère à l'enfant diminue.</p>

Sources :

- Site web: <https://www.evictionscolaire.ch/accueil>
- Site web: <https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten.html>

profawo , juin 2024