

Règlement maladies

Ce document permet aux collaborateurs/collaboratrices ainsi qu'aux parents d'avoir un cadre d'orientation concernant la prise en charge des enfants malades. Les enfants malades peuvent être accueillis dans les crèches kids & co tant qu'ils se sentent bien et qu'ils peuvent participer à la vie quotidienne de la crèche. Souvent les enfants malades se sentent mieux dans leur entourage familial qu'en crèche. Nous ne pouvons pas garantir dans les crèches l'encadrement 1:1 et le calme dont ils ont souvent besoin dans ces moments-là.

Principes

- En règle générale, un enfant malade doit être exempté de fièvre pendant au moins un jour (24 heures) lors de son retour à la crèche.
- L'enfant doit se rendre à la crèche sans prendre de médicament antipyrétique.
- Le personnel de la crèche n'administre pas de médicaments pour faire baisser la fièvre (sauf en cas de convulsions fébriles et de suspicion d'otite).
- Dans certains cas, nous nous basons sur les prescriptions des pédiatres.
- En cas de propagation aiguë de la maladie contagieuse, la crèche décide d'exclure temporairement et plus strictement les enfants porteurs de la maladie.

Maladie	Symptôme	Garde en crèche	Remarque
Maladie pieds-mains-bouche -> Virus	<ul style="list-style-type: none"> • Symptômes pseudo-grippeux (fièvre, maux de gorge, conjonctivite) • Eruption cutanée avec démangeaisons au niveau de la bouche et du nez • Éruption possible également dans les espaces entre les doigts et les orteils et dans la zone des couches (nourrissons) • Vésicules avec un étroit bord rouge 	<p>L'incubation se produisant 3 à 10 jours avant l'apparition des vésicules, il n'y a aucune raison, selon le médecin cantonal, d'exclure les enfants infectés de l'établissement.</p> <p>Ici, comme dans tous les cas, le principe du bien-être s'applique.</p> <p><u>Décision</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si l'enfant se sent bien et n'a pas de fièvre depuis 24 heures, il peut continuer à fréquenter la crèche. 	
Virus gastro-intestinal	<ul style="list-style-type: none"> • Vomissements • diarrhée • douleurs abdominales et crampes 	<p>En raison de la propagation rapide ainsi que des mesures d'hygiène strictes, il n'est pas possible pour la crèche de prendre en charge des enfants malades.</p> <p><u>Décision</u></p>	<p>Risque de déshydratation très élevé chez les nourrissons</p> <p>En cas de diarrhée, persistance, attention particulière à l'hygiène.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - L'enfant doit être pris en charge immédiatement et ne peut fréquenter la crèche qu'une fois qu'il ne présente plus de symptômes 	
Covid19 -> Virus	<ul style="list-style-type: none"> • Symptômes semblables à ceux de la grippe • perte du goût et de l'odorat 	Les mesures se basent sur les recommandations actuelles de l'OFSP	
Poux	<ul style="list-style-type: none"> • Fortes démangeaisons sur le cuir chevelu • Les lentes se trouvent souvent dans la nuque, derrière les oreilles et sur les tempes. • Les poux sont difficilement reconnaissables = ils s'adaptent à la couleur des cheveux. • Les lentes ressemblent à des écailles de cheveux, collent fermement à la tige capillaire 	<p>En cas d'infestation de lentes ou de poux, un traitement capillaire approprié doit être mis en œuvre immédiatement.</p> <p><u>Décision</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Après le premier traitement (effectué par les parents), l'enfant peut à nouveau fréquenter la crèche. 	
Grippe -> Virus	<ul style="list-style-type: none"> • Forte montée de fièvre avec frissons et sueurs. • Maux de tête, douleurs musculaires et douleurs dans les membres • Toux sèche, enrouement, maux de gorge 	<p><u>Décision</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si l'enfant se sent bien et n'a pas de fièvre pendant 24 heures, il peut continuer à fréquenter la crèche. 	
Virus VRS	<ul style="list-style-type: none"> • rhume • forte toux • fièvre • souvent aussi une conjonctivite 	<p>L'incubation se produisant 2 à 8 jours avant l'apparition des symptômes, il n'y a, selon le médecin cantonal, aucune raison d'exclure les enfants infectés de l'établissement.</p> <p>Ici, comme dans tous les cas, le principe de bien-être s'applique.</p> <p><u>Décision</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si l'enfant se sent bien et n'a pas de fièvre (et si possible pas de symptômes) pendant 24 heures, il peut continuer à fréquenter la crèche. 	Les complications les plus fréquentes sont les pneumonies, qui surviennent dans 40% des cas d'hospitalisation, en particulier chez les nourrissons et les enfants de moins de deux ans.

Faux croup	<ul style="list-style-type: none"> • Toux rauque/sèche • enrouement • difficulté à respirer • fébrile 	<u>Décision</u> <ul style="list-style-type: none"> - Si l'enfant se sent bien et n'a pas de fièvre pendant 24 heures, il peut continuer à fréquenter la crèche. 	Les nourrissons et les enfants de moins de trois ans sont les plus exposés. Le faux croup se manifeste généralement le soir ou au milieu de la nuit.
Rhume	<ul style="list-style-type: none"> • légers maux de gorge • Toux et rhume • Douleurs articulaires ou musculaires • Fatigue et abattement • Fièvre 	<u>Décision</u> <ul style="list-style-type: none"> - Si l'enfant se sent bien et n'a pas de fièvre pendant 24 heures, il peut continuer à fréquenter la crèche. 	
Scarlatine	<ul style="list-style-type: none"> • Forte fièvre • Maux de tête • Très fort mal de gorge et toux • La gorge est colorée en rouge écarlate, le pharynx est blanchâtre. Nausées et vomissements sont possibles. • Après 2 à 4 jours, la langue devient rouge, gonflée ou bosselée. 	<p>L'incubation est de 3 à 5 jours.</p> <u>Décision</u> <ul style="list-style-type: none"> - Si l'enfant se sent bien et qu'il n'a pas de fièvre depuis 24 heures, il peut aller à la crèche. 	La scarlatine ne présente aucun danger pour les femmes enceintes et leur enfant à naître.
Varicelle	<ul style="list-style-type: none"> • Tâches rouges qui démangent et qui se transforment en vésicules. • Fièvre • Fatigue 	<p>L'incubation ayant lieu 3 à 10 jours avant l'apparition des vésicules, il n'y a aucune raison selon le médecin cantonal d'exclure les enfants infectés de l'établissement. Dans 80% des cas, la maladie évolue sans symptômes.</p> <p>Ici, comme dans tous les cas, le principe de bien-être s'applique.</p> <u>Décision</u> <ul style="list-style-type: none"> - Si l'enfant se sent bien et n'a pas de fièvre pendant 24 heures, il peut continuer à fréquenter la crèche. 	Femmes enceintes avec contact : clarifier le statut de protection, consulter le gynécologue

Conjonctivite	<ul style="list-style-type: none"> • brûlure, sensation de corps étranger • Larmolement • Paupières collées • Ecoulement purulent (bactéries) 	<p><u>Décision</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'exclusion de l'établissement n'est nécessaire que lorsqu'il s'agit d'une kératoconjonctivite épidémique confirmée (causée par certains adénovirus). Dans cette situation, les enfants se sentent très malades et consultent souvent un médecin qui les diagnostique. L'enfant peut se rendre à la crèche avec toutes les autres conjonctivites. Dans ce cas également, il convient de veiller au bien-être de l'enfant. 	
Impetigo	<ul style="list-style-type: none"> • Éruption rouge qui démange, avec des cloques remplies de liquide ou de pus. • en général, le visage, les bras et les jambes sont touchés. • Une légère fièvre peut également être observée. 	<p>La période d'incubation est de 2 à 10 jours.</p> <p><u>Décision</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Les enfants ne peut pas aller à la crèche jusqu'à ce que le traitement antibiotique soit terminé. 	<p>Lorsque les vésicules éclatent ou sont grattées, elles libèrent d'autres agents pathogènes qui se transmettent à d'autres parties de la peau et à d'autres personnes. Lorsque les vésicules sèchent, elles forment des croûtes de couleur miel.</p>
Mycose buccale (mycose de la bouche) Candida albicans	<ul style="list-style-type: none"> • Un dépôt blanc dans la bouche et la gorge qui ressemble à du lait caillé. • Une muqueuse buccale rouge, enflammée et parfois légèrement hémorragique sous l'enduit. • Une sensation de fourrure dans la bouche, qui persiste même après les soins buccaux • Une altération du sens du goût 	<p>L'agent pathogène de la mycose buccale est contagieux. Le contact avec d'autres personnes ne doit pas pour autant être évité. En effet, l'infection ne se produit généralement que si la peau ou les muqueuses sont endommagées ou si le système immunitaire est affaibli. En d'autres termes, la mycose buccale ne survient pas à la suite d'une infection préalable, mais lorsque les agents pathogènes Candida albicans déjà présents sur la muqueuse buccale se multiplient librement.</p> <p><u>Décision</u></p> <p>Si l'enfant se sent bien, il peut aller à la crèche.</p>	<p>La mycose buccale est traitée avec une pommade prescrite par le médecin.</p>
Gale ou scabiose	<ul style="list-style-type: none"> • la peau est infestée de minuscules parasites 	<p><u>Décision</u></p>	<p>Les personnes vivant sous le même toit doivent être traitées</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Les acariens s'enfoncent dans la couche supérieure de la peau et y pondent des œufs. • La peau démange et une éruption cutanée se forme 	Les enfants peuvent être admis à la crèche après 24h après le début du traitement / ou en cas d'exclusion certaine du diagnostic.	-> https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/gesundheit/krankheiten-und-impfungen/uebertragbare-krankheiten-und-impfungen/kraetze.html
Coqueluche	<ul style="list-style-type: none"> • Symptômes semblables à ceux de la grippe • Toux sèche irritante, fortes quintes de toux avec étouffement et vomissements 	<u>Décision</u> -_Exclusion des malades (enfants et personnel) - Retour possible dès le 6 ^{ème} jour après le début de l'antibiothérapie ou antibiotiques à partir du 22 ^{ème} jour après le début de la toux ou dès que le diagnostic est exclu avec certitude	Obligation de déclarer les cas individuels dans les institutions accueillant des enfants de ≤ 6 mois
Rougeole	<ul style="list-style-type: none"> • fièvre, fatigue • douleurs abdominales, photophobie • Inflammation des muqueuses de la bouche = muqueuses sèches • toux, rhume, maux de gorge • éruption cutanée 	<u>Décision</u> - Exclusion et isolement à domicile dès le cas de suspicion - Retour, dès le 5 ^{ème} jour après le début de l'éruption ou après exclusion certaine de la rougeole par un examen microbiologique	
Oreillons	<ul style="list-style-type: none"> • Gonflement de la glande parotide = grosse joue • Difficultés à mâcher et à avaler • Forte fièvre • Gonflement des ganglions lymphatiques • Inflammation de la muqueuse buccale 	<u>Décision</u> Si l'enfant se sent bien et n'a pas de fièvre depuis 24 heures, il peut continuer à fréquenter la crèche.	
Rubéole	<ul style="list-style-type: none"> • éruption de petites tâches sur la peau • fièvre • maux de tête et douleurs dans les membres • augmentation de la taille des ganglions lymphatiques 	<u>Décision</u> Si l'enfant se sent bien et n'a pas de fièvre depuis 24 heures, il peut continuer à fréquenter la crèche.	Informers les femmes enceintes contagieux 7 jours avant l'apparition de l'éruption cutanée

Sources :

- Document "Recommandations pour l'exclusion préscolaire en cas de maladies transmissibles et de parasitoses" selon l'Association des médecins cantonaux de Suisse(VKS/AMCS).
- Concernant le virus RSV : <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/rsv.html> OFSP
- Concernant la conjonctivite : recommandation de l'Office de la santé publique de Berne

profawo Bern, Mai 2023